


UNA ITS QUE DEBES CONOCER PARA NO TENER: "LA TRICOMONIASIS"

Trichomonas




ASÍ ES COMO SE VE LA TRICOMONIASIS VAGINAL Y LOS PARASITOS QUE PROVOCAN ESTA INFECCIÓN

descripción de la ITS

La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual causada por el agente patógeno "Trichomonas vaginalis" (un parásito protozoario) En Chile, la tricomoniasis, aunque es una infección de transmisión sexual (ITS) común, no es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que no hay informes epidemiológicos específicos disponibles sobre su incidencia.

SINTOMAS

La mayoría de las personas que presentan tricomoniasis no presentan signos ni síntomas, pero, los síntomas pueden aparecer con el tiempo. cuando aparecen signos o síntomas son diferentes en los hombres y las mujeres. en las mujeres los síntomas son: una cantidad abundante de una secreción vaginal y a menudo con olor desagradable y puede ser de color transparente, blanco gris amarillo y verde.
enrojecimiento, ardor, picazón en los genitales
dolor al orinar o al tener relaciones sexuales
molestia en la parte inferior del estomago, mientras que en los hombres pocas veces se muestran los síntomas, sin embargo, cuando se muestran son:
picazón o irritación dentro del pene
sensación de ardor al orinar o luego de eyacular
secreción proveniente del pene.



ESTA ES LA BACTERIA QUE PROVOCALA TRICOMONIASIS

TRATAMIENTO

El tratamiento de la tricomoniasis requiere un medicamento antibiótico oral que sea eficaz contra las infecciones que causa este parásito, el tratamiento se puede hacer durante el embarazo, para evitar la tricomoniasis se debe hacer abstinencia sexual, consiste en el uso de preservativos durante las relaciones sexuales y si, es curable.

POSIBLES COMPLICACIONES

1. Aumento de riesgos al contraer o provocar otras infecciones de transmisión sexual
2. Asociación con un mayor riesgo de cáncer de próstata o del cuello del útero.
3. En los hombres riesgo de epididimitis prostatitis y disminución de la movilidad de los espermatozoides
4. La tricomoniasis puede dificultar la capacidad de tener hijos en mujeres.
5. Esto pasa rara vez, pero la tricomoniasis puede transmitirse de la madre al bebé durante el parto causando infecciones vaginales y respiratorias en el recién nacido.



COLORES QUE SALEN DEL FLUJO VAGINAL Y QUE SON.

Transmisión

El parásito se transmite entre las personas durante el contacto genital, incluido el sexo vaginal, oral o anal. La infección puede transmitirse entre hombres y mujeres, entre mujeres y, a veces, entre hombres.

La tricomoniasis también puede transmitirse de madre a hijo durante el parto, pero esta ITS no se contagia a través de la sangre ni por contacto directo no sexual, es decir, por compartir un baño, utensilios, alimentos o bebidas.

DIETA PARA LAS INFECCIONES VAGINALES


- ✓ Dieta y estilo de vida saludable
- ✓ Alimentos antibióticos: cebollas, ajos, arándanos, romero, tomillo,...
- ✓ Betacarotenos (espinacas, zanahoria,...)
- ✓ Alimentos probióticos
- ✓ Legumbres, frutos secos, etc.
- ✓ Infusión jengibre después de comer
- X Evitar tabaco y alcohol
- X Evitar azúcares y harinas

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ALIMENTOS QUE PREVIENEN LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRICOMONIASIS

Formas de prevención

Para prevenir la tricomoniasis, la forma más eficaz es evitar el contacto sexual o utilizar condones correctamente en cada relación sexual. También es importante comunicar cualquier sospecha de infección a las parejas sexuales para prevenir nuevas infecciones, en caso de madre e hijo se hace un tratamiento oportuno de la infección en la madre, uso correcto de preservativos y, en algunos casos, cesárea si la madre tiene tricomoniasis avanzada al momento del parto

Aquí es donde se ubica el parásito "Tricomoniasis"



Representación y Análisis de datos

Preguntas de encuesta

Pregunta 1- ¿Estás informado de cómo tratar una infección de transmisión sexual?

Pregunta 2- ¿Estás informado sobre las consecuencias que genera la infección de transmisión sexual Tricomoniasis?

Pregunta 3- ¿Todas las infecciones de transmisión sexual muestran síntomas visibles?

Pregunta 4- ¿Puedes contagiarte de una infección de transmisión sexual solo por compartir un baño?

Pregunta 5- ¿Es importante consultar a un médico si se sospecha de una infección de transmisión sexual?

Pregunta 6- ¿Se puede tener una infección de transmisión sexual y no saberlo?

Tabla de frecuencia

Variable	Respuesta si	Respuesta no
Pregunta 1	18	2
Pregunta 2	13	7
Pregunta 3	9	11
Pregunta 4	16	4
Pregunta 5	20	0
Pregunta 6	17	3

● Respuesta si

● Respuesta no



Análisis del gráfico

En este gráfico lo primero que se ve es que muchas de las personas encuestadas votaron por la respuesta si, y no muchos encuestados votaron por la respuesta no como por ejemplo en la pregunta 1, la cuál es: "¿Estás informado sobre las consecuencias que genera la infección de transmisión sexual tricomoniasis?"

En la pregunta 3, se observa que los votos están más equilibrados, y la pregunta es: '¿Todas las infecciones de transmisión sexual presentan síntomas visibles?'

En la pregunta 5 se puede observar que todos los 20 encuestados contestaron la respuesta "Si", y la pregunta es: "¿Es importante consultar a un médico si se sospecha de una infección de transmisión sexual?"

Conclusión

En este gráfico podemos concluir que las personas están informadas sobre las consecuencias, transmisiones, tratamiento de las ITS y en específico de la Tricomoniasis.

-INTEGRANTES-

-ISABELLA G.

-MILLARAY H.

-CAMILA M.

-BALASAR L.

CURSO: 7° A

FECHA DE ENTREGA: 20/05

ASIGNATURAS: CIENCIAS-MATEMÁTICAS-INGLÉS.