

# EL RIESGO DE LAS ITS

## COMO TRATAR LA ENFERMEDAD LIFOGANULOMA VENEREO


### 1. Síntomas

Durante la primera etapa aparece en el pene o en la vagina una pequeña ampolla indolora y llena de liquido. Posteriormente las ulseras se sieran y se cicatrizan , pero los tractos sinusoles pueden persistir o reapareser .



### Formas de contagio

La infeccion se trsansmite a traves del contacto sexual , presisamente durante la penetracion vaginal , anal u oral



CONCLUSION no tengan sexo

posibles complicaciones si no se tarta,el LGV puede causar complicaciones como la formación de abscesos, fistula y estenosis rectal,así como elefantiasis genital

### 1. tratamiento

el tratamiento consiste

- Tetraciclina o eritromicina por vía oral
- A veces se requiere el drenaje de los bubones para reducir los síntomas

La doxiciclina en dosis de 100 mg por vía oral 2 veces al día, durante 21 días, es el tratamiento de elección. Alternativamente, se puede indicar eritromicina en dosis de 500 mg por vía oral, 4 veces al día, durante 21 días. La azitromicina 1 g por vía oral 1 vez a la semana durante 3 semanas es otra alternativa.

El edema de los tejidos lesionados en estadios más avanzados puede no resolverse a pesar de la eliminación de la bacteria. Los bubones pueden drenarse con aguja o en forma quirúrgica si se considera necesario para lograr el alivio de los síntomas, pero la mayoría de los pacientes responden rápidamente a los antibióticos. Los bubones y los trayectos fistulosos pueden requerir cirugía, pero las estenosis rectales suelen poder dilatarse.


El contacto sexual con una persona que tiene linfogranuloma venéreo durante los 60 días previos a la aparición de los síntomas requiere un examen y un análisis de la infección por Chlamydia en la uretra, el cuello uterino o el recto según el sitio de exposición. Se deben tratar de forma presuntiva (con una dosis única de 1 g de azitromicina por vía oral o 100 mg de doxiciclina por vía oral 2 veces al día durante 7 días), en forma independiente de si la evidencia sugiere que tienen un linfogranuloma venéreo.

4 puedes contagiarte de una infeccion transmision sexual solo por compartir un baño

5

6

- pregunta 1
- pregunta 2
- pregunta 3
- pregunta 4
- pregunta 5
- pregunta 6



¡VIVE SIN LÍMITES!

San Leonardo Murialdo grupo 5

7A

Ignacia Huerta  
Tomas Garcia  
Daniel Perez  
Emilie Bonfort